

Oraler Konsum

Wirkungs-
Eintritt



Diese Grafik dient der groben Orientierung. Die Stärke der Wirkung kann individuell stark abweichen. Dosierungsangaben bezieht sich auf LSD als freie Base.



Nicht nur was du nimmst,
wie viel und wie oft,
beeinflusst die Wirkung.
Auch wie es dir geht,
mit wem und wo du bist,
trägt dazu bei!

WEITERE INFORMATIONEN



Weitere Informationen
zu **LSD** befinden sich auf
unserer Website.

checkit!
SUBSTANZINFORMATION

Diese Information stellt keine Anleitung oder Aufforderung zum Konsum von psychoaktiven Substanzen dar, sondern dient der Sensibilisierung. Substanzkonsum ist immer mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Checkit! rät vom Konsum der beschriebenen Substanz und anderer riskanter Stoffe ab. Wir weisen auch darauf hin, dass der Besitz, Verkauf und Konsum der beschriebenen Substanzen strafbar ist. Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Checkit! übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen entstehen können.

© Suchthilfe Wien gGmbH 2024

checkit!
SUBSTANZINFORMATION

LSD

Lysergsäurediethylamid

aka: Acid, Trips,
Würfel, Pappen

Wirkdauer

bis zu **12**
Stunden* (oral)

*abhängig von konsumierter Menge

Verfügbar als

üblicherweise als Flüssigkeit,
in kleinen Pillen oder kleine
Papierstücke (Trips)

Wirkungen

Die Effekte sind stark abhängig von der konsumierten Dosis, Konsumhäufigkeit, dem Set (wie es dir geht) und dem Setting (dem Umfeld, in dem konsumiert wird). LSD kann eine Intensivierung und Verfremdung der Wahrnehmung (Hören, Sehen, Riechen, Tasten), Synästhesien (Überlagerung einzelner Sinneswahrnehmungen), sowie eine Veränderung der Zeitwahrnehmung verursachen. Es kann zu einer Verstärkung von Stimmungen und Gefühlen, aber auch zu Verwirrung, Verunsicherung und Wahnvorstellungen führen.

In manchen Fällen kann es zu „Flashbacks“ kommen. Das bedeutet, dass Tage, Wochen oder Monate nach einer Einnahme ähnliche Symptome auftreten können.

Das Gesetz

LSD steht im Suchtmittelgesetz und ist illegal.



Safer Use & Risk Reduction

- Konsumiere nur, wenn du **körperlich und psychisch gesund** bist, in einer angenehmen Umgebung und mit Menschen, denen du vertraust.
- **Nutze Drug Checking!** Der Wirkstoffgehalt und Streckmittel können stark variieren.
- **Dosiere gering**, um die Wirkung anzutesten. Warte ab, bevor du nachlegst – mindestens 90 Minuten.
- **Vermeide Mischkonsum** mit anderen Substanzen, auch Alkohol.
- **Vermeide Konsum** bei psychischen Problemen oder psychischen Vorerkrankungen, Herz- und Kreislaufproblemen, Krampfanfällen und Epilepsie
- **Konsumiere nicht** während Schwangerschaft & Stillzeit.
- **Achtet aufeinander.** Sprich mit deinen Freund*innen, wenn es dir oder einer anderen Person nicht gut geht.
- **Nimm nicht am Straßenverkehr teil**, wenn du konsumiert hast.

